


Datum	
Ime in priimek preiskovanca	
Datum rojstva	
Zdravnik	

Izvid		
Antigen	U/ml	Razred
Mandlji	1,26	2
Jabolko	< 0.35	0
Marelice	< 0.35	0
Robide	< 0.35	0
Ajda	< 0.35	0
Indijski oreščki	8,82	3
Kravje mleko	4,40	3
Kumare	< 0.35	0
Jajčni rumenjaki	6,98	3
Gliadin	< 0.35	0
Lešnik	44,46	4
Gorčično seme	0,51	1
Muškatni orešček	< 0.35	0
Paprika	0,86	2
Breskev	< 0.35	0
Arašidi	25,53	4
Črni poper	< 0.35	0
Pistacije	6,27	3
Sezam	< 0.35	0
Soja	< 0.35	0
Jagode	< 0.35	0
Paradižnik	< 0.35	0
Orehi	< 0.35	0
Pšenica	9,32	3



#### **OPIS TESTA**

S pomočjo enicimsko-immunskega testa (ELISA) preiskava določa količino IgG4 protiteles v serumu na **24** najpogostejših alegenov, ki jih najdemo v hrani. Rezultati so predstavljeni kvantitativno v U/mL in semi-kvantitativno v razredih od 0 do 6. Alergeni v hrani (24) so uvrščeni v razrede glede na izmerjeno količino protiteles.

#### **POMOČ PRI INTERPRETACIJI REZULTATOV**

V višjem razredu kot je alergen, več protiteles je bilo zaznanih v preiskovanem serumu in več kliničnih simptomov je za pričakovati. Razredi so obarvani z različno barvo. Klasifikacija v posamezne razrede ne izkazuje klinične slike posameznika temveč daje vpogled v vrednost IgG4 protiteles.

#### **POVZETEK PREISKAVE**

##### **Seznam živil, ki so pokazala pozitiven odziv**

/

##### **Seznam živil, ki so pokazala zmeren odziv**

Indijski oreščki, kravje mleko, jajčni rumenjaki, lešniki, arašidi, pistacije, pšenica

#### **SPLOŠNO O INTOLERANCI NA HRANO**

Intolerance na hrano ne smemo enačiti z alergijo na hrano. Reakcija pri intoleranci je običajno zakasnela, simptomi nastopijo šele po nekaj dneh in običajno so manj nevarni kot alergijska reakcija. Med najpomembnejše simptome spadajo glavobol, nespečnost, povečana teža, pogosta utrujenost, napihnjenost, driska, kožne spremembe, bolečine v mišicah in sklepih, motnje koncentracije in spomina, dovzetnost za okužbe in še bi lahko naštevali. Imunski sistem reagira s tvorbo protiteles IgG4, ki jih merimo v krvi.

S to preiskavo lahko ugotovimo katera živila so povzročila nastanek IgG4. Z umikom le-teh iz prehrane se stanje lahko izboljša že po nekaj dneh.

*Končni izvid je samo eden, potrjen z žigom MEDICARE PLUS d.o.o. Razmnoževanje izvida v kakršnikoli obliki ni dovoljeno brez predhodnega pisnega dovoljenja laboratorija.*

Vodja laboratorija:

mag. Branka Svetic, spec.med.biokem.

Medicare PLUS d.o.o.,  
diagnostični laboratorij,  
Erbežnikova 2,  
1000 Ljubljana

**LABORATORIJSKI IZVID**

Rezultati preiskave  
Nutritivna intoleranca IgG4 24 ELISA

Medicare PLUS d.o.o.,  
diagnostični laboratorij,  
Erbežnikova 2,  
1000 Ljubljana

**LABORATORIJSKI IZVID**

Rezultati preiskave  
Nutritivna intoleranca IgG4 24 ELISA

Medicare PLUS d.o.o.,  
diagnostični laboratorij,  
Erbežnikova 2,  
1000 Ljubljana

**LABORATORIJSKI IZVID**

Rezultati preiskave  
Nutritivna intoleranca IgG4 24 ELISA

Medicare PLUS d.o.o.,  
diagnostični laboratorij,  
Erbežnikova 2,  
1000 Ljubljana

**LABORATORIJSKI IZVID**

Rezultati preiskave  
Nutritivna intoleranca IgG4 24 ELISA